

- A fost introdus recent în țara noastră; începând cu noiembrie 2008 se desfășoară prima campanie națională de vaccinare, la fete de 10-11 ani;
- Se comercializează **2 tipuri** de vaccin anti-HPV: **Cervarix** și **Gardasil** (3);

## LA CINE APARE INFECȚIA CU HPV?

### În mod sigur nu la fetele de 10-11 ani, vizate de campania Guvernului!

- Infecția cu virusul HPV apare la femeile active sexual, nu la fetițe!
- Obiceiurile sexuale sunt un factor determinant în infecția cu HPV (9).

## CÂND APARE CANCERUL DE COL UTERIN?

- Acest cancer apare după infecția cu virusul HPV (unul din tipurile oncogene) pe un „col uterin receptiv” -adică **deja afectat de boli cu transmitere sexuală** (gonoree, candidoză, trichomoniază)-precum și de alți factori favorizanți precum fumatul (7);
- Leziunile produse la nivelul colului uterin vor determina o modificare la nivelul genelor oncogene, provocând formarea cancerului; aceste modificări pot fi produse și de către **contraceptive orale** precum și alți factori mai puțin cunoscuți (8);
- Progresia de la infecția inițială la leziunile preinvazive și, ulterior, cancer invaziv (cancer în fază tardivă), necesită o

perioadă de chiar și 10 ani sau mai mult (10).

## CÂT DE EFICIENT E VACCINUL?

### Nu se știe încă!

- În momentul de față **nu există încă date care să dovedească eficiența vaccinării anti-HPV în prevenția cancerului invaziv**. Va trece încă destul timp până când astfel de date vor deveni disponibile, pentru că **vaccinul se utilizează pe plan mondial de doar câțiva ani**, în timp ce perioada de la infectarea cu HPV până la apariția cancerului invaziv este frecvent de peste 10 ani (11);
- Din același motiv, există prea puține date inclusiv despre efectele pe termen lung ale acestui vaccin (12).

## CE ȘTIM SIGUR DESPRE VACCIN?

- Că vaccinul nu vindecă o infecție deja existentă! (4);
- Că are **efecte secundare!**

## CARE SUNT EFECTELE SECUNDARE?

- mâncărime, roșeață sau durere la locul injecției, febră, grețuri;
- șoc anafilactic și epilepsie;
- paralizii;
- atacuri de panică și tulburări circulatorii;
- stare de rău, dureri de cap și de spate;
- căderea părului și amenoree secundară (lipsa menstruației);

- tulburări de sensibilitate, dureri articulare, erupții pe piele, oboseală accentuată, amețeli;
- lipsa poftei de mâncare, depresie;
- amețeli, tremurături, parestezii (senzație de arsură) la picioare și la față;
- meningită virală;
- deces (14, 17).

Până în iunie 2008, în SUA erau înregistrate aproape 9.000 de efecte adverse, inclusiv 10 pierderi de sarcină (17).

**CAZURI MORTALE:** În SUA s-au raportat 25 de decese posibil asociate cu Gardasil (16). Alte două decese după vaccinare s-au constatat în Germania și Austria (15).

### **Din aceste motive, noi nu încurajăm vaccinarea. Decizia vă aparține.**

## DE CE ESTE GREȘITĂ ACEASTĂ PREVENȚIE (VACCINAREA)?

- Premizele de la care se pleacă pentru prevenirea cancerului de col sunt greșite; se crede că vaccinul va rezolva totul și nu se iau în considerare cauzele directe ale infecției și bolii: **relațiile sexuale de la o vârstă fragedă; partenerii multipli; contractarea bolilor cu transmitere sexuală (gonoree, etc.); fumatul; folosirea contraceptivelor orale, etc. Toți acești factori favorizează producerea cancerului de col uterin.**
- În locul eliminării cauzelor, **riscăm să ne îmbolnăvim copiii** (fetele) administrându-le

un vaccin încă insuficient testat și mai ales cu multe efecte secundare.

## **DACĂ NU MĂ VACCINEZ, CUM MĂ POT APĂRA DE CANCER?**

- **Evitați factorii fazorizanți** de mai sus;
- Efectuați **Testul Babeș-Papanicolau** de două ori pe an, dacă ați început activitatea sexuală (16).

## **DE CE NUMIȚI VACCINAREA "EXPERIMENT PERICULOS"?**

Pentru că vaccinul HPV nu este pe deplin testat, evaluarea sa urmând să se încheie în sept. 2009 (16). Copiii dvs. au fost aleși să fie „cobai”.

## **DE CE AR APROBA GUVERNUL ADMINISTRAREA UNUI VACCIN INSUFICIENT TESTAT?**

Pentru că „este vorba despre bani”. Marile concerne farmaceutice acordă comisioane importante distribuitorilor de medicamente și nu ar fi prima dată când statul lezează interesele cetățenilor, preferându-le pe cele ale afaceriștilor.

## **CUM ÎMI POT FERI COPIII DE ACEST VACCIN?**

Orice părinte are **dreptul de a refuza vaccinarea copilului** său, semnând o declarație pe propria răspundere. Nici un vaccin nu poate fi administrat „obligatoriu”.

### **Bibliografie:**

- 1), 4), 12), 16). Dr. Christa Todea Gross. *Îndrumarul Federației Organizațiilor Ortodoxe Provita din România. Editura Renașterea, Cluj 2008, p. 331-335;*  
7), 8). Dr. Traian Ciucă. *Boli transmisibile pe cale sexuală. Editura Științifică, București, 1993, p. 59, 66;*  
3), 10), 11). <http://medic.pulsmedia.ro/>  
9). Dr. Genoveva Tudor. *Bolile Homosexualilor - Un documentar medical la zi, Editura Christiana, Bucuresti 2005, pp. 102-103.*  
14). [http://www.sanego.de/Medikament\\_Gardasil](http://www.sanego.de/Medikament_Gardasil)  
15). Hans U. P. Tolzin, <http://www.impf-report.de>  
16). <http://www.judicialwatch.org/documents/2008/JWReportFDAhpvVaccineRecords.pdf>  
17). [http://www.judicialwatch.org/documents/2008/Gardasil\\_VAERS\\_All.pdf](http://www.judicialwatch.org/documents/2008/Gardasil_VAERS_All.pdf)

Mai multe informații la  
[www.provitabucuresti.ro/gardasil-cervarix/](http://www.provitabucuresti.ro/gardasil-cervarix/)

ASOCIAȚIA CREȘTIN-ORTODOXĂ  
"PRO-VITA"



pentru născuți și nenăscuți  
*Filiala București*

O.P. 1 – C.P. 410

Tel. 0728.673.673; fax 031 815.27.80

E-mail: provitabucuresti@yahoo.com

Web: [www.provitabucuresti.ro/gardasil-cervarix/](http://www.provitabucuresti.ro/gardasil-cervarix/)

**DACĂ AVEȚI COPII SAU INTENȚIONAȚI SĂ AVEȚI, ACEST PLIANT VĂ PRIVEȘTE!**



**VACCINUL  
"ANTICANCER"  
UN EXPERIMENT PERICULOS!**

**CE ESTE VACCINUL  
"ANTICANCER DE COL UTERIN"?**

- Un vaccin cu **scopul declarat de a preveni infecția cu virusul HPV** (papilomavirusul uman, care poate duce la **cancer de col uterin**) (1);